


Профилактика желтой лихорадки



Желтая лихорадка — острое вирусное геморрагическое заболевание, передаваемое инфицированными комарами.

«Желтой» она называется из-за того, что у некоторых пациентов развивается желтуха.



Группы риска:

Сорок семь стран — в Африке (34) и Центральной и Южной Америки (13) — либо эндемичны, либо имеют в своем составе регионы, эндемичные по желтой лихорадке.

Симптомы: высокая температура, головная боль, желтуха, миалгия, тошнота, рвота и усталость

Передача инфекции:

Основными переносчиками являются комары.

Существует три типа циклов передачи инфекции:

лесная желтая лихорадка: во влажных тропических лесах (инфицированные комары кусают людей, работающих или находящихся в лесах); промежуточная желтая лихорадка: полудомашние комары (те, что размножаются как в дикой природе, так и вблизи жилищ) Самый распространенный тип вспышки болезни в Африке;

городская желтая лихорадка:

инфицированные люди заносят вирус в густонаселенные районы с высокой плотностью популяции комаров и низким или нулевым иммунитетом к этой болезни.



Профилактика:

вакцинация — основной способ профилактики желтой лихорадки (учреждение здравоохранения «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г.Минска»);

борьба с комарами — переносчиками заболевания.