

Корь

Корь - острая вирусная инфекция, для которой характерна очень высокая восприимчивость.

► **Источником инфекции** при кори является человек, который выделяет вирусы во внешнюю среду уже с конца инкубационного периода (за два дня до проявления первых симптомов) и продолжается до 4-го дня высыпаний, а при развитии коревой пневмонии – до 10 дней.

► **Передача инфекции:**

Высоко контагиозный вирус кори распространяется **преимущественно воздушно-капельным путем**: при кашле чихании либо разговоре. Вирус очень летуч, легко проникает в соседние помещения, известны случаи распространения вируса с током воздуха по вентиляционной системе здания.

► **Признаки и симптомы:**

Инкубационный период длится в среднем около 1-2 недель, но может достигать и 21 дня. Первые симптомы кори могут не отличаются от банальной ОРВИ: вялость, головная боль, кашель, повышение температуры тела до 39⁰С и выше, также для кори характерны проявления конъюнктивита (глаза красные и слезятся, появляется светобоязнь).

На внутренней поверхности щек могут образовываться характерные пятна, напоминающие скопление зерен манной крупы. Через 1-2 дня развивается типичное проявление кори – **сыпь**. Для коревой сыпи характерна этапность высыпаний. Сыпь состоит из мелких папул (волдырей), окруженных пятном; она мелкая и обильная, яркая; способна, сливаясь, покрывать всю поверхность тела.

При заболевании корью могут возникать довольно серьезные осложнения. В их число входят воспаление легких (пневмония), воспаление среднего уха (отит), а иногда и такое грозное осложнение как подострый склерозирующий панэнцефалит, характеризующейся медленно прогрессирующей деструкцией головного мозга, начинающейся через несколько лет после перенесенного заболевания (даже в легкой форме).

► **Если у Вас появились вышеуказанные симптомы** (повышение температуры тела, кашель, покраснение глаз и слезотечение, сыпь и т.д.) то следует незамедлительно обратиться к врачу (вызвать врача на дом). Это важно не только для скорейшей постановки диагноза и начала лечения, но и для принятия противоэпидемических мер в трудовом, детском организованном коллективе, который посещал заболевший, семейном очаге.

► **Профилактика кори**

Самый действенный способ предотвратить заболеваемость корью – это сделать прививку. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок Республики Беларусь вакцинация против кори проводится детям в возрасте 1 год и 6 лет трехкомпонентной вакциной против кори, эпидемического паротита, краснухи.

Министерством здравоохранения Республики Беларусь взрослому населению предоставлена возможность получить профилактическую прививку против кори в случаях, если человек не привит и не болел корью (в медицинской документации отсутствуют документальные сведения о вакцинации против кори, о перенесенной кори, о положительном результате серологического исследования крови на напряженность иммунитета) либо имеются сведения только об одной прививке против кори.